

## RENSEIGNEMENTS

Dr Nathalie GERARD

(Trésorier CPIOA)  
Tél. : 05.56.78.99.28

Les partenaires de La Société Française de Parodontologie et d'Implantologie Orale


### PLATINIUM



### GOLD



### CLASSIQUE



### REGIONAUX



SFPIO Société Française de Parodontologie  
et d'Implantologie Orale

REGION AQUITAINE

## Fêlures et fractures dentaires : Diagnostic, traitement et gestion parodontale

**Samedi 19 Octobre 2013**



Dr Bernard SCHWEITZ

Dr Dominique MARTIN

(Paris - France)



La participation à cette journée attribue 60 points  
(N° d'accréditation : 064726106-154/48)



[www.cpioa.fr](http://www.cpioa.fr)

Hôtel Burdigala  
Rue Georges Bonnac - Bordeaux - 8 h 30 - 18 h

**Samedi 19 Octobre 2013**

**Dr Bernard Schweitz (Paris - France)**

**Fêlures radiculaires et fractures verticales des dents dépulpées  
Diagnostic et gestion de leurs conséquences parodontales**

*Si la fracture verticale se distingue assez facilement en raison de la mobilité des fragments dentaires, la fêlure radiculaire d'une dent dépulpée présente des signes cliniques qui peuvent être aisément confondus avec un abcès parodontal. Une démarche diagnostique rigoureuse au travers d'un examen clinique et radiographique local et global permet d'en faire le diagnostic différentiel.*

*Face à de telles lésions, l'attitude clinique est le plus souvent l'extraction de la dent. En fonction de la précocité du diagnostic, les conséquences parodontales peuvent être plus ou moins étendues. Lorsque la découverte est tardive, ce qui est fréquemment le cas, la destruction osseuse périphérique peut être massive. La cicatrisation après extraction s'en trouve affectée, et le volume tissulaire résiduel ne permet souvent pas le placement d'un implant dans des conditions optimales. Une reconstruction osseuse et/ou muqueuse pré ou per-implantaire adaptée devient alors nécessaire.*

**Dr Dominique Martin (Paris - France)**

**Fêlures longitudinales de la dent pulpée : Diagnostic et traitement**

*Difficilement discernable à l'œil nu lors de l'examen clinique, une fêlure longitudinale sur dent pulpée provoque des symptômes très spécifiques qui peuvent être confondus avec les symptômes d'une algie oro-faciale. Le diagnostic est d'autant plus difficile à établir que les secteurs dentés peuvent paraître indemnes cliniquement et que les signes associés restent le plus souvent frustrés et diffus. La démarche diagnostique est basée sur l'écoute du patient et l'utilisation de tests spécifiques. Le traitement doit tenir compte de deux impératifs contradictoires : assurer la cohésion des fragments afin d'éviter la propagation de la fêlure en direction apicale et préserver la structure coronaire résiduelle. Les thérapeutiques adhésives trouvent là des indications spécifiques que ce soit en technique directe ou en technique indirecte.*

**Calendrier cycle pratique de Parodontologie 2013-2014**

**21-22 juin 2013 : 1<sup>er</sup> degré** - Examen clinique, diagnostic, thérapeutique initiale

**4-5 octobre 2013 : 2<sup>e</sup> degré** - Chirurgies résectrices

**7-8 février 2014 : 3<sup>e</sup> degré** - Chirurgies reconstructrices et mucogingivales

**Avril 2014 : 4<sup>e</sup> degré** - Parodontie et prothèse, synthèse pluridisciplinaire

**Calendrier cycle pratique d'Implantologie Orale 2013-2014**

**3-4 octobre 2013 : 1<sup>er</sup> degré** - Chirurgie implantaire

**Avril 2014 : 2<sup>nd</sup> degré** - Prothèse implantaire

**PROGRAMME 2013**

**Samedi 7 décembre 2013**

**Dr Corinne TADDEI (Strasbourg)  
La prothèse adjointe et les implants**

**BULLETIN D'INSCRIPTION**

**à retourner accompagné de votre règlement libellé à l'ordre du CPIOA :  
Dr Nathalie GERARD - 1, Chemin du Gary - 33450 Saint-Loubès**

Le Docteur : .....

Adresse : .....

.....

Code postal : ..... Ville : .....

Téléphone : ..... Fax : .....

E-mail : .....

Cotisation SFPIO-CPIOA 2013 .....110 €

S'inscrit à la journée du 19 Octobre 2013 (membre SFPIO 2013) .....110 €

TOTAL..... €

L'inscription à la journée comprend le déjeuner et les pauses